

Ces mesures sont valables à partir du 10/01/22 et remplacent les précédentes

SE FAIRE TESTER : QUAND, COMMENT, OÙ ?



VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES?



RHUME



MAL DE TÊTE



FIÈVRE



PERTE DU GOÛT
OU DE L'ODORAT



COURBATURES



DIFFICULTÉS
RESPIRATOIRES



FATIGUE



DIARRHÉE

Allez en isolement et évaluez vos symptômes à l'aide de l'outil d'auto-évaluation sur www.masanté.be plutôt que de contacter votre médecin*

UN TEST N'EST PAS NÉCESSAIRE

L'isolement peut être levé.

UN TEST EST NÉCESSAIRE

Restez en isolement et demandez un code via masanté.be et prenez rendez-vous pour un test PCR (via masanté.belgique.be) ou un test rapide (via une pharmacie participante figurant sur pharmacie.be).

CONSULTEZ LE RÉSULTAT DE VOTRE TEST VIA MASANTÉ.BE, L'APPLI COVIDSAFE OU LE SMS QUE VOUS RECEVREZ.

NEGATIF

(vous n'êtes pas infecté.e)

L'isolement peut être levé, mais restez très prudent pendant une semaine : limitez vos contacts, évitez les personnes vulnérables, respectez les distances, continuez le télétravail et portez un masque .

POSITIF

(vous êtes infecté.e)

7 jours en isolement. Fin de l'isolement après 7 jours si au moins 3 jours sans fièvre et amélioration des autres symptômes. Transmettez les coordonnées de vos contacts à haut risque via www.masante.be. Après cela, restez encore très prudent.e pendant 3 jours : prenez encore des mesures de protection, telles que la limitation du nombre de contacts au strict nécessaire, le port permanent d'un masque (de préférence FFP2) dans une zone intérieure

* Sauf si vous n'avez pas de téléphone portable ou de PC, si vous avez de gros doutes ou si vous êtes une personne présentant un risque plus élevé (par exemple : en cas de grossesse, de maladie cardiaque, hépatique ou pulmonaire ou pour un patient atteint d'un cancer).

Plus d'info sur info-coronavirus.be

.be